

# KOMUNIKAT NR 1

## **Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 lutego 2022 r. dotyczący wyznaczenia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2022 r. w województwie małopolskim**

W dniu 18 lutego 2022 r. w godzinach wieczornych Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym utrzymującym 70 sztuk kur ogólnoużytkowych w gminie Zabierzów w powiecie krakowskim w woj. małopolskim.

Jest to pierwsze ognisko HPAI w 2022 r. na terytorium województwa małopolskiego.

W gospodarstwie zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. W dniu 19 lutego 2021 roku wszystkie sztuki drobiu w ww. gospodarstwie, u których stwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków, zostały zabite oraz poddane utylizacji.

Stwierdzenie w dniu 18 lutego br. ww. ognisko HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich.

W Polsce:

- w 2021 roku stwierdzono 403 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, w których łącznie utrzymywane było ponad 14,2 mln sztuk drobiu.
- w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2022 roku stwierdzono 21 ognisk u drobiu i 22 przypadki tej choroby u ptaków dzikich.

Na obszarze UE HPAI potwierdzono w większości krajów europejskich.

W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dalszym ciągu apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „łanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.